

STUDIA ONCOLOGICA



ISSN 1313-7115

Обзори по онкология
Reviews in Oncology



2014

година VI • брой 2

По-кратко време за приложение – повече време за активен живот



- **Herceptin SC** е показан за лечение на възрастни пациенти с HER2-положителен рак на гърдата - алтернатива на **Herceptin за интравенозно приложение (IV)**
- Утвърденото лечение вече се прилага за по-кратко време /2-5 минути/ - лекота и удобство за пациенти и здравни специалисти
- **Herceptin SC** притежава сходни фармакокинетичен профил, ефикасност и безопасност с тези на **Herceptin IV**
- Намаляват общите разходи за лечение и се освобождава медицински ресурс
- **Herceptin SC** е готов за употреба разтвор с фиксирана доза 600 mg трастузумаб. Не е необходима натоварваща доза
- 9 от 10 пациенти на Herceptin предпочитат подкожна инжекция с **Herceptin SC**, заради пестене на време и намаляване усещането за болка и дискомфорт

Референции:

Ismael G, Hegg R, Muehlbauer S, et al. Lancet Oncol 2012; 13:869-878.

Jackisch C, Stroyakovskiy D, Muehlbauer S, et al. Oral presentation at the 8th EBCC, Vienna, Austria (Abstract 1BA)

Perez-Garcia J, Cortes J. Lancet Oncol 2012; 13(9): 850-851.

КХП Herceptin 24.07.2014

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата <http://www.ema.europa.eu>.

Лекарствен продукт по лекарско предписание

Дата на актуализиране на текста в КХП 24.07.2014.

Референтен HER/2014/094-01. Уведомление до ИАЛ № IAL-47527/04.11.2014

Рош България ЕООД: София 1618, ул. „Бяло поле“ 16, Тел: (02) 818 4444, факс: (02) 859 1199

Гореща линия: 0700 10 280 (денонощно за територията на цялата страна, на цената на един градски разговор)